

Escola Secundária de Alcácer do Sal

Ano letivo 2012/2013

Física e Química A – Bloco II (11ºano)

Teste de Avaliação 5A - 29/05/2013

1. O dióxido de carbono pode ser obtido pela combustão de carvão:




1.1. Qual é o volume de oxigénio, em condições PTN, necessário para originar 4mol de dióxido de carbono? Considere a reacção completa.

1.2. Calcule a quantidade química necessária de carvão para libertar 470,5 kcal de energia.

1.3. Considera que na reacção completa de 12,8 g de oxigénio se obteve experimentalmente 16,0g de dióxido de carbono. Calcule o rendimento da reacção.


1.4. Quando se adiciona 7,2g de carbono e 22,2g de oxigénio qual é a quantidade de dióxido de carbono que se forma supondo a reacção completa?

2. O metanol pode ser obtido pela reacção química de equilíbrio



2.1. Tendo em conta o gráfico da figura ao lado, Indique a opção **incorrecta**:

- (A) Até ao instante t_1 , o sistema esteve em equilíbrio.
- (B) No instante t_1 foi adicionado CO (g).
- (C) No instante imediatamente a seguir a t_1 o Q tem um valor maior que o K_c .
- (D) No gráfico está representado dois estados de equilíbrio.



2.2. Escreva a expressão da constante de equilíbrio.

2.3. No equilíbrio, qual a relação entre K_c e Q?

2.4. Selecciona a alternativa que contém os termos que devem substituir as letras (a), (b) e (c), respectivamente, de modo a tornar verdadeiras as frases seguintes:

“A adição de um catalisador ao sistema em equilíbrio ...(a)... da concentração de CO. A adição de Hidrogénio ao sistema em equilíbrio ...(b)... da concentração de CH₃OH. A diminuição da pressão da mistura gasosa ...(c)... da concentração de CH₃OH.”

- (A) não produz alteração... produz aumento... produz diminuição
- (B) não produz alteração... produz aumento... produz aumento
- (C) produz aumento ... produz diminuição ...produz aumento
- (D) não produz alteração... produz diminuição ...produz aumento

2.5.Considere o seguinte quadro:

Concentração	[CO]	[H ₂]	[CH ₃ OH]
Início (mol.dm ⁻³)	0,8	0,6	0
Equilíbrio (mol.dm ⁻³)	x	y	0,3

Os valores de x e y devem ser respectivamente (selecione a alternativa correcta):

- (A) 0,8 e 0,6;
- (B) 0,6 e 0,2;
- (C) 0,6 e 0,4;
- (D) 0,4 e 0,4;

3. Considere as seguintes soluções:

Solução A
 $[H_3O^+] = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol.dm}^{-3}$
 $T = 10^\circ\text{C}$

Solução B
 $[H_3O^+] = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol.dm}^{-3}$
 $T = 25^\circ\text{C}$

Sabendo que $K_w(10^\circ\text{C}) = 2,9 \times 10^{-15}$ e $K_w(25^\circ\text{C}) = 1,0 \times 10^{-14}$, selecione a **opção correcta**:



- (A) Ambas as soluções são neutras, pois têm valor de pH=7,00
- (B) Na solução A, a concentração de H₃O⁺ é superior à concentração de OH⁻.
- (C) A solução A é alcalina.
- (D) A concentração de OH⁻ é igual nas duas soluções.

4. Seleccione a opção que completa correctamente a seguinte afirmação:

“Segundo a teoria de Brønsted-Lowry:

- (A) Um ácido gera iões H^+ em solução aquosa.”
- (B) A água é uma espécie neutra, pois reage com ácidos e com bases.”
- (C) Um ácido é uma espécie dadora de protões.”
- (D) As soluções aquosas são ácidas.”

5. Observe as seguintes equações químicas:



5.1. Indique os pares ácido-base conjugados.


5.2. Qual é o nome atribuído às espécies químicas que se comportam como o H_2SO_4 ?

6. Com o objetivo de determinar a concentração de uma solução de hidróxido de sódio, $NaOH(aq)$, um grupo de alunos realizou uma actividade laboratorial.

Os alunos começaram por diluir a solução inicial de hidróxido de sódio cinco vezes. Em seguida, titularam $10,0\text{cm}^3$ da solução diluída com uma solução padrão de ácido clorídrico, $HCl(aq)$, de pH 0,60, tendo gasto $15,20\text{cm}^3$ desta solução até ao ponto final da titulação, detectado com um indicador adequado.

6.1. Refira o nome do instrumento de medida utilizado para medir com rigor o volume da solução de $NaOH$ a titular.

6.2. A reacção que ocorre pode ser representada por



Determine a concentração da solução inicial de $NaOH$.

Apresente todas as etapas de resolução.

6.3. Seleccione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes. A escolha inadequada do indicador, que geralmente é adicionado à solução que se encontra _____, conduz a uma diminuição de _____ na determinação da concentração do titulado.

- (A) no *erlenmeyer* ... precisão
- (B) no *erlenmeyer* ... exactidão
- (C) na bureta ... precisão
- (D) na bureta ... exactidão

6.4. Suponha que, em vez de um indicador, os alunos utilizavam um sensor de pH, o que lhes permitiria obter o gráfico do pH em função do volume de titulante (curva de titulação).

Apresente o esboço da curva de titulação que seria obtida pelos alunos, assinalando o pH no ponto de equivalência.

7. Colocaram-se pequenos pedaços de zinco (Zn) em cada uma de duas soluções aquosas contendo cátions metálicos em concentrações semelhantes: uma solução de sulfato de cobre (II), CuSO_4 , e uma solução de nitrato de magnésio, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.
Os resultados obtidos encontram-se na tabela seguinte.

Metal \ Catião metálico	Cu^{2+}	Mg^{2+}
Zn	Houve reacção e formou-se um depósito sobre o zinco, apresentando este metal um aspecto bastante corroído. A solução inicial era azul e, no final, ficou praticamente incolor.	Não houve reacção.

7.1. A semi-reacção de redução que ocorre pode ser traduzida por

- (A) $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
- (B) $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$
- (C) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- (D) $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$

7.2. Qual dos três metais (Zn, Cu, Mg) apresenta maior poder redutor?

7.3. O ião Cu^{2+} confere à chama uma cor verde azulada, que resulta da sobreposição das radiações

- (A) emitidas pelos iões Cu^{2+} em processos de excitação.
- (B) emitidas pelos iões Cu^{2+} em processos de desexcitação.
- (C) absorvidas pelos iões Cu^{2+} em processos de excitação.
- (D) absorvidas pelos iões Cu^{2+} em processos de desexcitação.

8. O cloreto de prata, AgCl , é um sal cujo produto de solubilidade é, a 25°C , $1,8 \times 10^{-10}$.

Numa solução aquosa contendo iões Ag^+ e Cl^- , a 25°C , formar-se-á um precipitado de AgCl , se

- (A) as concentrações daqueles iões forem inferiores à solubilidade do AgCl .
- (B) as concentrações daqueles iões forem iguais à solubilidade do AgCl .
- (C) o produto das concentrações daqueles iões for superior a $1,8 \times 10^{-10}$.
- (D) o produto das concentrações daqueles iões for inferior a $1,8 \times 10^{-10}$.

FIM

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8	Total
12	12	20	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	8	12	8	8	8	8	200